

がん化学療法レジメン一覧

〈大腸癌〉

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
FOLFIRI	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
FOLFIRI+BV	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	ベバシズマブ(アバステン)	5mg/kg	点滴静注 day 1	
FOLFIRI+Cetu	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	セツキシマブ(アービタックス)	初回400mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	
		2回目以降250mg/m ²		
FOLFIRI+ベクティビックス	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	イリノテカン(CPT-12)	150mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	パニツムマブ(ベクティビックス)	6mg/kg	点滴静注 day 1	
mFOLFOX6	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	オキサリプラチン(エルプラット)	85mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
mFOLFOX6+BV	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	オキサリプラチン(エルプラット)	85mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	ベバシズマブ(アバステン)	5mg/kg	点滴静注 day 1	
mFOLFOX6+Cetu	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	オキサリプラチン(エルプラット)	85mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	セツキシマブ(アービタックス)	初回400mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	
		2回目以降250mg/m ²		

mFOLFOX6+ベクティビックス	レボホリナート(アイソボリン)	200mg/m ²	点滴静注 day 1	14日
	オキサリプラチン(エルプラット)	85mg/m ²	点滴静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注 day 1	
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注 day 1	
	パニツムマブ(ベクティビックス)	6mg/kg	点滴静注 day 1	
IRIS	イリノテカン(CPT-11)	125mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日
	ティーエスワン	40~60mg/回を1日2回	経口投与 day 1-14	
CPT-11+Getu	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注 day 1,15,29	49日
	セツキシマブ(アービタックス)	初回400mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22,29,36,42	
		2回目以降250mg/m ²		
ゼローダ+BV	カペシタビン(ゼローダ)	1200~2100mg/回を1日2回	経口投与 day 1-14	21日
	ベバシズマブ(アバステン)	7.5mg/kg	点滴静注 day 1	
XELOX+BV	ベバシズマブ(アバステン)	7.5mg/kg	点滴静注 day 1	21日
	オキサリプラチン(エルプラット)	130mg/m ²	点滴静注 day 1	
	カペシタビン(ゼローダ)	1200~2100mg/回を1日2回	経口投与 day 1-14	
Getu単独	セツキシマブ(アービタックス)	初回400mg/m ²	点滴静注 day 1	7日
		2回目以降250mg/m ²		
SOX+Getu	セツキシマブ(アービタックス)	初回400mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	21日
		2回目以降250mg/m ²		
	オキサリプラチン(エルプラット)	130mg/m ²	点滴静注 day 1	
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	
XELOX	オキサリプラチン(エルプラット)	130mg/m ²	点滴静注 day 1	21日
	カペシタビン(ゼローダ)	1200~2100mg/回を1日2回	経口投与 day 1-14	

〈胃癌〉

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
XELOX	オキサリプラチン(エルプラット)	130mg/m ²	点滴静注 day 1	21日
	カペシタビン(ゼローダ)	1200~2100mg/回を1日2回	経口投与 day 1-14	
nab-PTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
RAM	サイラムザ(ラムシルマブ)	8mg/kg	点滴静注 day1, 15	28日
nab-PTX+RAM	アルブミン懸濁型パクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
	サイラムザ(ラムシルマブ)	8mg/kg	点滴静注 day1, 15	
SOX	オキサリプラチン(エルプラット)	100mg/m ²	点滴静注 day 1	21日
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	
レンチナン+TS-1	レンチナン	2mg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22,29,36	42日
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-28	
CDDP+TS-1	シスプラチン(ランダ)	60mg/m ²	点滴静注 day 8	35日
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-21	

PTX	パクリタキセル(タキソール)	80mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
CPT-11	イリノテカン(カンプト)	150mg/m ²	点滴静注 day1,15	35日

<膀胱癌>

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
GEM(3投1休)	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
GEM+TS-1	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 15	28日
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	
GEM+nab-PTX	レプミン懸濁型パクリタキセル(アブラキサ)	125mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	

<胆道癌>

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
GEM(3投1休)	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 8, 15	28日
GEM+TS-1	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 15	28日
	ティーエスワン	80mg/m ²	経口投与 day 1-14	
GEM+CDDP	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	点滴静注 day1, 8,	21日
	シスプラチン(ランダ)	25mg/m ²	点滴静注 day1, 8	

<肺癌>

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
ナベルピン	ビノレルピン(ナベルピン)	25mg/m ²	急速静注 day 1, 8	21日
PEM	ペメトレキセド(アリムタ)	500mg/m ²	急速静注 day 1	21日

<悪性神経膠腫>

レジメン名	薬剤	用量	投与経路 投与日	クール
テモダール+BV(初発、放射線療法併用)	テモゾロミド(テモダール)	75mg/m ²	経口投与 day 1-42	-
	ベバシズマブ(アバスチン)	10mg/kg	点滴静注 day 1,15,29,42	
テモダール+BV(維持療法期)	テモゾロミド(テモダール)	150mg/m ²	経口投与 day 1-5	28日
	ベバシズマブ(アバスチン)	10mg/kg	点滴静注 day 1,15	
アバスチン(再発、維持療法期後)	ベバシズマブ(アバスチン)	15mg/kg	点滴静注 day 1	21日